

Pro Start® PLUS®



Es un producto líquido constituido por nutrientes y cofactores hormonales, diseñado para ser aplicado en el período de receso invernal en frutales de hoja caduca.



CONTROL

Uva de mesa, Rancagua, VI Región, Thompson Seedless

• COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno (N)	15%
Calcio (Ca)	5%
Magnesio (Mg)	1%
Zinc (Zn)	0,2%
Boro (B)	0,01%

Cofactores de Crecimiento
Nitrógeno en forma Amínica

Valores expresados en % peso/volumen

pH	4,5
Densidad (g/L)	1220 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C

CARACTERÍSTICAS

- Los nutrientes contenidos en Prostart Plus están acomplejados y/o quelatados para asegurar máxima absorción en el tejido.
- Los cofactores hormonales contenidos en el producto actúan a nivel celular.
- No es tóxico para el operador ni la maquinaria.
- No es fitotóxico.



TESTIGO

Cerezos, Rancagua, VI Región, Bing.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE PROSTART PLUS

- Complemento nutricional para lograr una brotación uniforme de yemas florales y vegetativas.
- Permite recuperar yemas del tercio medio del árbol con una aplicación dirigida.
- Genera nuevo crecimiento en material vegetal antiguo.
- Mejora el vigor de brotes en plantas debilitadas por aplicación de cianamida
- Promueve una mejor floración y cuaja.
- Incrementa la actividad fotosintética de las primeras hojas.
- No afecta a cultivos vecinos y es de fácil almacenamiento.
- Óptima relación costo / beneficio.

ProStart® PLUS®



CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Almendros, ciruelos, damascos, duraznos, nectarines y arándanos.	4 - 6%	• Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes de la fecha de floración.
Cerezos.	8%	• Si busca homogenizar, se recomienda utilizar el producto acompañado de 6 Kg de Nitrato de Calcio por 100 L de agua. Realizar aplicación de 30 a 20 días antes de inicio de brotación. En el caso de aplicaciones más tardías, se recomienda aplicar el producto sin nitrato de calcio.
	8%	• Si se busca precocidad acompañado de 6 kg de Nitrato de Calcio por 100 L/Agua. Realizar esta aplicación 7 días después de la Cianamida Hidrogenada.
	6 - 8%	• Para plantas en formación. Aplicar 7-10 días antes del inicio de brotación.
Frambuezas y zarzaparrillas.	4 - 6%	Mojar ramas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación.
Uva de mesa.	4 - 6%	• Zona norte: Si se desea vigorizar brotación aplicar en yema algodonosa posterior a la aplicación de Cianamida Hidrogenada. Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón con un mojamiento mínimo de 800 L/Ha.
	4 - 6%	• Zona centro-sur: Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en yema algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación.
Uva pisquera.	4 - 6%	Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en yema algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Mojamiento mínimo de 800 L/Ha.
Uva vinífera.	10%	• Mojar corona y cargadores con nebulizadora o pitón, aplicar en yema algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Usar mojamientos sobre los 400 L/Ha. Asegurar una dosis mínima de 40 L/ha de Prostart Plus para 400 L de agua.
	15% 5	• Mojar corona y cargadores con un mojamiento bajo los 100 L/ha. Aplicar en yema algodonosa con un rango de 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Asegurar 15 L de Prostart Plus en la aplicación de 100 L/ha.
Manzanos y Perales.	4 - 6%	• Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación.
Kiwis.	4 - 6%	• Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar hasta 30 días antes de la fecha de brotación.
Nogales.	4 - 6%	• Mojar ramas y ramillas con nebulizadora o pitón. Aplicar desde 30 hasta 5 días antes de la fecha de brotación. Se recomienda la utilización de Prostart Plus con 5 - 6 Kg de Nitrato de Calcio cada 100 L de agua.

* De acuerdo a la especie y estado de desarrollo, se recomienda realizar la aplicación de Prostart Plus con mojamientos de 1000 a 1500 L/ha.

Stoller recomienda utilizar Porter® como adherente al momento de la aplicación de ProStartPlus®

De acuerdo a la especie y estado de desarrollo, se recomienda realizar la aplicación de ProStart Plus® con mojamientos entre 1000 a 1500 L/ha.

En Brotación



Con **ProStart® PLUS®** cada brote recibe igual cantidad de nutrientes y cofactores hormonales.

Permite una brotación homogénea.

En Floración



Al aplicar **ProStart® PLUS®** la nutrición en floración viene no solo de la reserva, sino también del producto.

Al florecer, la nutrición de la planta proviene directamente de la reserva.

Leer cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

Condiciones de venta:

1. El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2. Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

1- Agua 2- **ProStart® PLUS®** 3- Agroquímico

Stoller en su región es:

XV Región
Alvaro Villarroel
+56 9. 3 224 0339

III Y IV Región
Ulises Pizarro | Felipe Pizarro
+56 9. 9 534 2016 | +56 9. 3 443 3941

V Región
Luisa Baeza
+56 9. 6 845 3268

Región Metropolitana
Oriana Reyes | Josefa Bitsch
+56 9. 4 248 8538 | +56 9. 3 379 4332

VI Región
Alejandro Guajardo | Nicolás Torres
+56 9. 8 916 2012 | +56 9. 9 451 4354

VII Región
Paula Vargas | Nicole Guzmán
+56 9. 9 451 4384 | +56 9. 3 469 1858

VIII Región
Luis Milla
+56 9. 9 630 6790

IX Región
Camilo Quezada
+56 9. 4 010 6875

XIV y X Región
Antonio Villagra
+56 9. 9 537 5239

Jefe Regional Zona Norte (III a VI)
Fredy Morales
+56 9. 9 451 4385

Jefe Regional Zona Sur (VII a XIV)
Claudio Romero
+56 9. 9 161 8424



Para consultas técnicas contactarse con él Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el Departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

stoller@stoller.cl
www.stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A. Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2 314 789

® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.